

**CONCOURS ARTS ET MÉTIERS ParisTech - ESTP - POLYTECH****Épreuve de Mathématiques 2 PC**

Durée 3 h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

---

**L'usage de calculatrices est interdit.**

**AVERTISSEMENT**

La **présentation**, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la **rédaction**, la **clarté et la précision** des raisonnements entreront pour une **part importante** dans **l'appréciation des copies**. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont invités à encadrer les résultats de leurs calculs.

Dans tout le problème, on note  $\tan$  la fonction tangente.

Etant donné un entier naturel  $n \geq 1$  et une fonction  $f$  de classe  $C^\infty$  sur un intervalle ouvert  $I$ , on note  $f^{(n)}$  la dérivée  $n$ -ième de  $f$  sur  $I$ . La notation  $f^{(0)}$  désigne  $f$ .

**Tournez la page S.V.P.**

**Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.**

---

**Partie IA .**

1. Quelle est la période de la fonction  $\tan$  ?
2. Représenter la fonction  $\tan$  sur l'intervalle  $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ .
3. Démontrer l'existence d'une suite de polynômes  $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$  telle que :

- $T_0(X) = X$ ,
- et pour tout entier naturel  $n$ ,  $\tan^{(n)}$ , dérivée  $n$ -ième de la fonction  $\tan$ , vérifie :

$$\forall x \in ] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[ , \tan^{(n)}(x) = T_n(\tan(x)).$$

On explicitera une relation de récurrence vérifiée par les polynômes  $T_n$  et  $T_{n+1}$ .

4. Expliciter les polynômes  $T_1, T_2, T_3$ .
5. Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Démontrer que les coefficients du polynôme  $T_n$  sont des entiers naturels. Quel est le degré du polynôme  $T_n$  ?
6. Justifier qu'il existe une unique suite de nombres entiers naturels  $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$  telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1, \forall x \in ] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[ , \tan(x) = \sum_{j=0}^n \frac{t_j}{(2j+1)!} x^{2j+1} + \int_0^x \frac{(x-t)^{2n+1}}{(2n+1)!} T_{2n+2}(\tan(t)) dt.$$

On citera précisément le théorème utilisé.

**Partie IB.**

Soit  $I$  un intervalle ouvert de  $\mathbb{R}$  tel que  $0 \in I$  et symétrique par rapport à 0. Soit  $f$  une fonction de la variable réelle  $x$  de classe  $C^\infty$  sur  $I$ . Pour tout entier naturel non nul  $n$ , on note  $f^{(n)}$  sa dérivée  $n$ -ième et  $R_n$  la fonction définie pour  $x \in I$  par :

$$R_n(x) = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^x f^{(n)}(t)(x-t)^{n-1} dt.$$

**On suppose que  $f$  est impaire et que pour tout entier naturel  $n$  non nul et tout nombre réel  $x$  dans  $I$  tel que  $x \geq 0$ ,  $f^{(n)}(x) \geq 0$ .**

7. Soit  $x \in I$ . Pour tout entier naturel non nul  $n$ , justifier l'égalité :

$$R_n(x) = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + R_{n+1}(x).$$

8. Soit  $b \in I$  tel que  $b > 0$ .
  - (a) Démontrer que la suite  $(R_n(b))_{n \geq 1}$  est convergente.
  - (b) Soient  $x \in [0, b]$  et  $n$  un entier naturel non nul.

i. Justifier l'égalité :

$$R_n(x) = \frac{x^n}{(n-1)!} \int_0^1 f^{(n)}(tx)(1-t)^{n-1} dt.$$

ii. En déduire que :

$$0 \leq R_n(x) \leq \frac{x^n}{(n-1)!} \int_0^1 f^{(n)}(tb)(1-t)^{n-1} dt.$$

iii. Démontrer que :

$$R_n(x) \leq \left(\frac{x}{b}\right)^n R_n(b).$$

(c) En déduire que pour tout  $x$  dans  $] -b, b[$ ,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

On justifiera précisément la convergence de la série.

9. La suite  $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ayant été définie dans la question IA6, démontrer que :

$$\forall x \in ] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[, \tan(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t_n}{(2n+1)!} x^{2n+1}.$$

10. Que peut-on dire du rayon de convergence de la série entière  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t_n}{(2n+1)!} z^{2n+1}$  ? Justifier votre réponse.

## Partie II A.

Soit  $n$  un entier naturel  $\geq 2$ . On note  $\mathbb{R}_n[X]$  le  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel formé par l'ensemble des polynômes à coefficients dans  $\mathbb{R}$  de degré  $\leq n$ . Pour tout polynôme  $P$  dans  $\mathbb{R}_n[X]$ , on note  $P'$  son polynôme dérivé.

Pour tout  $P$  dans  $\mathbb{R}_n[X]$ , on note  $\psi_n(P)$  l'application de la variable réelle  $x$  définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \psi_n(P)(x) = \int_x^{x+1} P(t) dt.$$

1. Calculer  $\psi_n(X^i)$ , pour  $i \in \{0, \dots, n\}$ .
2. Vérifier que pour tout  $P$  dans  $\mathbb{R}_n[X]$ ,  $\psi_n(P)$  est une application polynomiale de degré  $\leq n$ .
3. Démontrer que  $\psi_n$ , l'application qui associe à  $P$  dans  $\mathbb{R}_n[X]$ ,  $\psi_n(P)$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}_n[X]$ .
4. Ecrire la matrice de  $\psi_n$  sur la base  $(1, X, \dots, X^n)$ .
5. Démontrer que  $\psi_n$  est un automorphisme de  $\mathbb{R}_n[X]$ .
6. L'endomorphisme  $\psi_n$  est-il diagonalisable ? Justifier la réponse.

---

7. Soit  $P$  dans  $\mathbb{R}_n[X]$ .

(a) Justifier qu'il existe un polynôme  $Q$  dans  $\mathbb{R}_{n+1}[X]$  tel que  $Q' = P$ .

(b) Démontrer que  $\forall x \in \mathbb{R}, \psi_n(P)(x) = Q(x+1) - Q(x)$ .

(c) Démontrer que  $\psi_n(P)'$  le polynôme dérivé du polynôme  $\psi_n(P)$  vérifie  $\psi_n(P)' = \psi_n(P')$ .

### Partie II B.

8. Démontrer l'existence et l'unicité d'une suite de polynômes  $(S_m)_{m \in \mathbb{N}}$  telle que :

(a)  $S_0 = 1$ ,

(b)  $\forall k \in \mathbb{N}, S'_{k+1} = (k+1)S_k$ ,

(c)  $\forall k \in \mathbb{N}$  tel que  $k \geq 1, \int_0^1 S_k(t) dt = 0$ .

9. Expliciter les polynômes  $S_1, S_2$  et  $S_3$ .

10. Pour  $k \in \mathbb{N}$ , démontrer que  $S_k$  est un polynôme unitaire de degré  $k$ .

11. Pour  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $k \geq 2$ , démontrer l'égalité  $S_k(0) = S_k(1)$ .

12. Soit  $m \in \mathbb{N}$ . Démontrer que  $S_m$  vérifie l'équation :

$$\forall x \in \mathbb{R}, S_m(1-x) = (-1)^m S_m(x).$$

On pourra utiliser l'unicité de la suite définie par les conditions de la question IIB9.

13. Pour un entier naturel  $k \leq n$ , démontrer que  $S_k$  est l'unique polynôme dans  $\mathbb{R}_n[X]$  tel que  $\psi_n(S_k)(X) = X^k$ .

Dans toute la suite, on note  $\sigma_k = S_k(0)$ , pour tout entier naturel  $k \leq n$ . Ainsi,  $\sigma_0 = 1$ .

14. Expliciter les valeurs de  $\sigma_1, \sigma_2$  et  $\sigma_3$ .

15. On suppose  $n \geq 3$ . Démontrer que  $\sigma_k = 0$ , pour tout entier naturel impair  $k$  tel que  $3 \leq k \leq n$ .

16. Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Démontrer l'égalité :

$$\forall x \in \mathbb{R}, S_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sigma_k x^{n-k}.$$

17. En déduire que pour tout entier  $n \geq 2$ ,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \sigma_k = 0.$$

18. Expliciter un programme en python qui permet de calculer  $\sigma_{50}$ .

---

### Partie III .

Dans cette partie, on considère la série entière

$$S(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sigma_n}{n!} z^n.$$

On **admet** que la série entière a un rayon de convergence  $R > 0$ . On note  $D$  son disque de convergence.

1. Démontrer que pour tout  $z$  dans  $D$ ,  $e^z S(z) = z + S(z)$
2. Soit la fonction  $T$  définie par :

$$T(z) = \begin{cases} \frac{z(e^{2iz} + 1)}{(e^{2iz} - 1)}, & \text{si } 0 < |z| < \pi \\ 0, & \text{si } z = 0. \end{cases}$$

Démontrer qu'il existe un nombre réel  $\rho$ ,  $\rho \in ]0, R]$ , tel que  $T$  admet un développement en série entière sur le disque de centre 0 et de rayon  $\rho$ . Exprimer les coefficients de ce développement en série entière en fonction de  $(\sigma_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

3. En utilisant l'égalité (qu'on justifiera)

$$\forall x \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[ \setminus \{0\}, \quad i \tan x = \frac{2(e^{4ix} + 1)}{(e^{4ix} - 1)} - \frac{(e^{2ix} + 1)}{(e^{2ix} - 1)},$$

déterminer pour tout entier naturel  $n$ , une expression de  $t_n$  en fonction de  $\sigma_n$ .