

Les calculatrices sont interdites.

Le sujet est composé de quatre exercices indépendants.

EXERCICE 1

Soit n un entier naturel non nul. On note $E_n = \mathbb{R}_n[X]$ et pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $P_k = X^k$.

Questions de cours

Soit α un réel.

1. Justifier que la famille $\mathcal{E} = (1, X - \alpha, \dots, (X - \alpha)^n)$ est une base de E_n .
2. Soit P un polynôme de E_n .
Donner sans démonstration la décomposition de P dans la base \mathcal{E} à l'aide des dérivées successives du polynôme P .
3. On suppose que α est une racine d'ordre $r \in \llbracket 1, n \rrbracket$ de P .
Déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de P par $(X - \alpha)^r$.

À tout polynôme P de E_n , on associe le polynôme Q défini par :

$$Q(X) = X P(X) - \frac{1}{n} (X^2 - 1) P'(X)$$

et on note T l'application qui à P associe Q .

4. Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Déterminer $T(P_k)$.
5. Montrer que T est un endomorphisme de E_n .
6. Écrire la matrice M de T dans la base $\mathcal{B} = (P_0, P_1, \dots, P_n)$ de E_n .
7. On suppose que λ est une valeur propre réelle de l'endomorphisme T et soit P un polynôme unitaire, vecteur propre associé à la valeur propre λ .
 - 7.1. Montrer que P est de degré n .
 - 7.2. Soit z_0 une racine complexe de P d'ordre de multiplicité $r \in \mathbb{N}^*$. Prouver que $z_0^2 - 1 = 0$.
 - 7.3. En déduire une expression de P .
8. Déterminer les éléments propres de l'endomorphisme T .
L'endomorphisme T est-il diagonalisable ?

EXERCICE 2

Questions de cours

1. Soient a et b deux réels avec $a > 0$. Choisir sans justification l'expression correcte de a^b :

$$(A) : e^{b \ln(a)} \quad (B) : e^{a \ln(b)} \quad (C) : e^{\ln(a) \ln(b)}.$$

2. Soient x et y deux réels tels que $x < y$ et t un réel de $]0, 1[$.
Comparer t^x et t^y .
3. Donner, sans démonstration, le développement en série entière de la fonction exponentielle réelle et donner son domaine de validité.

4. On considère la fonction Γ définie par $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$.

On admet que cette fonction est définie sur $]0, +\infty[$ et que, pour tout réel x strictement positif :

$$\Gamma(x + 1) = x \Gamma(x).$$

Calculer $\Gamma(1)$ et en déduire, en effectuant un raisonnement par récurrence, la valeur de $\Gamma(n + 1)$ pour $n \in \mathbb{N}$.

5. Pour $x \in \mathbb{R}$, on note, lorsque cela a un sens :

$$F(x) = \int_0^1 t^x dt$$

où, comme il est d'usage, $t^x = t^{(t^x)}$.

- 5.1. Déterminer l'ensemble de définition de F .
- 5.2. Déterminer le sens de variation de F .
- 5.3. Démontrer que pour tout x réel positif, on a : $F(x) \geq \frac{1}{2}$.
- 5.4. Démontrer que F est continue sur son ensemble de définition.
- 5.5. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$.
Les théorèmes utilisés seront cités avec précision et on s'assurera que leurs hypothèses sont bien vérifiées.
- 5.6. Dresser alors avec soin le tableau de variations de F et donner une allure générale de sa courbe représentative dans un repère orthonormal. On admettra que $F'(0) = \frac{1}{4}$ et on tracera la tangente au point d'abscisse $x = 0$.
6. Soit x un réel strictement positif.

Pour tout entier naturel n , on note g_n la fonction définie sur $]0, 1[$ par $g_n(t) = \frac{t^{nx} \ln^n(t)}{n!}$.

- 6.1. Démontrer que la série de fonctions $\sum_{n \in \mathbb{N}} g_n$ converge simplement sur $]0, 1[$ et donner sa somme.

- 6.2. Démontrer que, pour tout entier naturel n , $\int_0^1 |g_n(t)| dt = \frac{1}{n!} \frac{\Gamma(n+1)}{(nx+1)^{n+1}}$.

- 6.3. Établir enfin que l'on a :

$$F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(1+nx)^{n+1}}.$$

EXERCICE 3

On note E l'espace vectoriel des fonctions à valeurs réelles continues sur \mathbb{R}_+ .

Pour tout élément f de E et tout $x \in \mathbb{R}_+$ on pose $F(x) = \int_0^x f(u) du$.

1. Justifier que F est de classe C^1 sur \mathbb{R}_+ et donner pour tout $x \in \mathbb{R}_+$ l'expression de $F'(x)$.

Soit $\Psi : f \in E \mapsto \Psi(f)$ définie par : $\forall x \in \mathbb{R}_+, \Psi(f)(x) = \int_0^1 f(xt) dt$.

2. Exprimer, pour tout réel x strictement positif, $\Psi(f)(x)$ à l'aide de $F(x)$.

3. Justifier que la fonction $\Psi(f)$ est continue sur \mathbb{R}_+ et donner la valeur de $\Psi(f)(0)$.

4. Montrer que Ψ est un endomorphisme de E .

5. **Surjectivité de Ψ**

$$\text{Soit } h : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto h(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{pour } x > 0 \\ 0 & \text{pour } x = 0 \end{cases} .$$

5.1. Montrer que la fonction h est continue sur \mathbb{R}_+ .

5.2. La fonction h est-elle de classe C^1 sur \mathbb{R}_+ ?

5.3. Soit $g \in \text{Im}(\Psi)$.

Montrer que la fonction $x \mapsto xg(x)$ est de classe C^1 sur \mathbb{R}_+ .

5.4. A-t-on $h \in \text{Im}(\Psi)$?

5.5. Conclure.

6. Montrer que Ψ est injective.

7. **Recherche des éléments propres de Ψ**

7.1. Justifier que 0 n'est pas valeur propre de Ψ .

Soit $\mu \in \mathbb{R}$. On considère l'équation différentielle (L) sur \mathbb{R}_+^* :

$$y' + \frac{\mu}{x} y = 0.$$

7.2. Résoudre (L) sur \mathbb{R}_+^* .

7.3. Déterminer les solutions de (L) prolongeables par continuité sur \mathbb{R}_+ .

7.4. Déterminer alors les valeurs propres de Ψ et les sous-espaces propres associés.

8. Soit $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$. Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose :

$$f_i : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto f_i(x) = x^i \text{ et } g_i : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto g_i(x) = \begin{cases} x^i \ln(x) & \text{pour } x > 0 \\ 0 & \text{pour } x = 0 \end{cases}$$

On note $\mathcal{B} = (f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_n)$ et F_n le sous-espace vectoriel de E engendré par \mathcal{B} .

8.1. On veut montrer que la famille $\mathcal{B} = (f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_n)$ est une base de F_n

Soient $(\alpha_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ et $(\beta_j)_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ des scalaires tels que $\sum_{i=1}^n \alpha_i f_i + \sum_{j=1}^n \beta_j g_j = 0$. (*)

8.1.1. Montrer que $\alpha_1 = \beta_1 = 0$.

On pourra simplifier l'expression () par x lorsque x est non nul.*

8.1.2. Soit $p \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. On suppose que $\alpha_1 = \dots = \alpha_p = \beta_1 = \dots = \beta_p = 0$.

Démontrer que $\alpha_{p+1} = \beta_{p+1} = 0$.

8.1.3. Conclure et déterminer la dimension de l'espace vectoriel F_n .

8.2. Où l'on démontre que Ψ induit un endomorphisme sur F_n

8.2.1. Soient $x > 0$ et $p \in \mathbb{N}^*$. Montrer que l'intégrale $\int_0^x t^p \ln(t) dt$ est convergente et la calculer.

8.2.2. En déduire que Ψ induit un endomorphisme Ψ_n sur F_n .

8.3. Donner la matrice de l'application Ψ_n dans la base \mathcal{B} .

8.4. Démontrer que Ψ_n est un automorphisme de F_n .

8.5. Soit $z : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto z(x) = \begin{cases} (x + x^2) \ln(x) & \text{pour } x > 0 \\ 0 & \text{pour } x = 0 \end{cases}$.

Après avoir vérifié que $z \in F_n$, déterminer $\Psi_n^{-1}(z)$.

EXERCICE 4

Soit n un entier naturel non nul.

Questions de cours

1. Soit p une projection vectorielle de rang $r \in \mathbb{N}$.

1.1. Donner, en fonction de r , une matrice W de p dans une base adaptée.

1.2. Donner les spectres possibles de W .

1.3. Comparer $\mathbf{rg}(W)$ et $\mathbf{tr}(W)$.

1.4. Calculer $\mathbf{det}(W)$.

On considère la famille X_1, \dots, X_n de variables aléatoires indépendantes définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ toutes suivant la loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$.

Soit M une variable aléatoire discrète de Ω dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que pour tout ω dans Ω , $M(\omega)$ est diagonalisable et semblable à $\Delta(\omega) = \text{diag}(X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$.

2. On note T la variable aléatoire $\mathbf{tr}(M)$.

2.1. Déterminer $T(\Omega)$, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire T .

2.2. Donner la loi de probabilité de T et l'espérance de la variable aléatoire T .

3. En déduire la loi de probabilité de la variable aléatoire $R = \mathbf{rg}(M)$.

4. On note D la variable aléatoire $\mathbf{det}(M)$.

4.1. Déterminer $D(\Omega)$.

4.2. Donner la loi de probabilité de D et calculer l'espérance de la variable aléatoire D .

5. On se propose de déterminer la probabilité de l'évènement Z :

« les sous-espaces propres de la matrice M ont tous la même dimension ».

5.1. On note V l'évènement : « M ne possède qu'une seule valeur propre ». Calculer $\mathbb{P}(V)$.

5.2. On suppose n impair. Déterminer $\mathbb{P}(Z)$.

5.3. On suppose n pair et on pose $n = 2r$. Calculer $\mathbb{P}(T = r)$. En déduire $\mathbb{P}(Z)$.

6. Pour tout $\omega \in \Omega$, on note $U(\omega) = \begin{pmatrix} X_1(\omega) \\ \vdots \\ X_n(\omega) \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et $A(\omega) = U(\omega) \times (U(\omega))^T = (a_{ij}(\omega))_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2}$.

6.1. Soit $\omega \in \Omega$. Déterminer, pour tout couple $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $a_{ij}(\omega)$.

6.2. Donner la loi de probabilité de chaque variable aléatoire a_{ij} .

6.3. Montrer que $\mathbf{tr}(A) = \sum_{i=1}^n X_i$.

6.4. Déterminer les valeurs prises par la variable aléatoire $\mathbf{rg}(A)$.

6.5. Pour tout ω dans Ω , donner les valeurs propres de la matrice $A(\omega)$.

6.6. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire $\mathbf{rg}(A)$.

FIN

Éléments de correction

EXERCICE 1

Soit n un entier naturel non nul. On note $E_n = \mathbb{R}_n[X]$ et pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $P_k = X^k$.

Questions de cours

Soit α un réel.

1. La famille \mathcal{E} est une famille de polynômes non nuls échelonnés en degré : elle est donc libre. De plus, elle est de cardinal $n + 1 = \dim(E_n)$. C'est donc une base de E_n .

2. C'est la formule de Taylor en α : $P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k$. Les composantes de P dans la base \mathcal{E} sont donc $\left(P(\alpha), P'(\alpha), \dots, \frac{P^{(n)}(\alpha)}{n!} \right)$.

3. Comme α est une racine d'ordre r de P , $P(\alpha) = P'(\alpha) = \dots = P^{(r-1)}(\alpha) = 0$ et $P^{(r)}(\alpha) \neq 0$. D'après la formule de Taylor : $P = \sum_{k=r}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k = (X - \alpha)^r \sum_{k=0}^{n-r} \frac{P^{(k+r)}(\alpha)}{(k+r)!} (X - \alpha)^k$. Donc le reste de la division euclidienne de P par $(X - \alpha)^r$ et le polynôme nul et le quotient est $\sum_{k=0}^{n-r} \frac{P^{(k+r)}(\alpha)}{(k+r)!} (X - \alpha)^k$.

À tout polynôme P de E_n , on associe le polynôme Q défini par :

$$Q(X) = X P(X) - \frac{1}{n} (X^2 - 1) P'(X)$$

et on note T l'application qui à P associe Q .

4. $T(P_k) = X^{k+1} - \frac{k}{n} (X^2 - 1) X^{k-1}$. Si $k = 0$, on obtient $T(1) = X$ et si $0 < k < n$, $T(P_k) = \frac{n-k}{n} P_{k+1} + \frac{k}{n} P_{k-1}$, et si $k = n$, $T(X^n) = X^{n-1}$.

5. On vérifie que T est linéaire, puis on remarque que pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $T(P_k) \in E_n$. Comme (P_0, \dots, P_n) est une base de E_n , les images des éléments de E_n par T sont dans E_n .

$$6. M = \begin{pmatrix} 0 & 1/n & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 2/n & \ddots & \vdots \\ 0 & (n-1)/n & \ddots & \ddots & \\ \vdots & \ddots & \ddots & & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1/n & 0 \end{pmatrix}.$$

7. On suppose que λ est une valeur propre réelle de l'endomorphisme T et soit P un polynôme unitaire, vecteur propre associé à la valeur propre λ .

7.1. Notons a le coefficient dominant de P . Alors le coefficient dominant de XP est encore a et celui de $\frac{1}{n}(X^2 - 1)P'$ est $\frac{\deg(P)}{n}a$. Donc, si $\deg(P) \neq n$, $\deg(T(P)) = \deg(P) + 1$, donc P ne peut pas être un vecteur propre. Ainsi, $\deg(P) = n$.

7.2. Il existe $Q \in E_n$ tel que $P = (X - z_0)^r Q$ avec $Q(z_0) \neq 0$. Donc $P' = r(X - z_0)^{r-1} Q + (X - z_0)^r Q' = (X - z_0)^{r-1}(rQ + (X - z_0)Q')$. En posant $R = (rQ + (X - z_0)Q')$, on remarque que $R(z_0) \neq 0$. De plus, $\lambda P - XP = \frac{1}{n}(X^2 - 1)P'$, donc $(\lambda - X)(X - z_0)Q = \frac{1}{n}(X^2 - 1)R$. En évaluant en z_0 , on obtient $0 = z_0^2 - 1$.

7.3. D'après la question précédente, il existe $\alpha \in \llbracket 0, n \rrbracket$ tel que $P = (X - 1)^\alpha (X + 1)^{n-\alpha}$.

8. D'après la question précédente, les vecteurs propres unitaires de T sont de la forme $P = (X - 1)^\alpha (X + 1)^{n-\alpha}$. Alors $T(P) = X(X - 1)^\alpha (X + 1)^{n-\alpha} - \frac{1}{n}(X^2 - 1)(\alpha(X - 1)^{\alpha-1}(X + 1)^{n-\alpha} + (n - \alpha)(X - 1)^\alpha (X + 1)^{n-\alpha-1}) = (X - 1)^\alpha (X + 1)^{n-\alpha} \left(X - \frac{\alpha}{n}(X + 1) - \frac{n - \alpha}{n}(X - 1) \right) = \left(1 - \frac{2\alpha}{n} \right) P$. Ainsi, les valeurs propres de T sont les $1 - \frac{2\alpha}{n}$, pour $\alpha \in \llbracket 0, n \rrbracket$, avec $P = (X - 1)^\alpha (X + 1)^{n-\alpha}$ comme vecteur propre associé. T est diagonalisable car il a $n + 1 = \dim(E_n)$ valeurs propres distinctes.

EXERCICE 2

Questions de cours

1. Réponse (A) : $e^{b \ln(a)}$.

2. Comme $\ln(t) < 0$, $x \ln(t) > y \ln(t)$, donc $t^x = e^{x \ln(t)} > e^{y \ln(t)} = t^y$.

3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$.

4. $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = -[e^{-t}]_0^{+\infty} = 1$.

Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ que $\Gamma(n + 1) = n!$. L'initialisation est déjà faite. Prenons $n \in \mathbb{N}$ et supposons que $\Gamma(n + 1) = n!$. Alors $\Gamma(n + 2) = (n + 1)\Gamma(n + 1) = (n + 1)n!$ par hypothèse de récurrence. Donc $\Gamma(n + 2) = (n + 1)!$. On conclut alors par récurrence.

5. Pour $x \in \mathbb{R}$, on note, lorsque cela a un sens :

$$F(x) = \int_0^1 t^x dt,$$

où, comme il est d'usage, $t^x = t^{(t^x)}$.

5.1. Soit $x \in \mathbb{R}$.

Alors $f : t \mapsto t^x = e^{x \ln(t) \ln(t)}$ est continue sur $]0, 1]$.

Lorsque $x < 0$, $\lim_{t \rightarrow 0^+} x \ln(t) = +\infty$, donc $\lim_{t \rightarrow 0^+} e^{x \ln(t) \ln(t)} = -\infty$ et la fonction f se prolonge par continuité en 0 par 0. De même lorsque $x = 0$.

Lorsque $x > 0$, $\lim_{t \rightarrow 0^+} x \ln(t) = -\infty$, donc $\lim_{t \rightarrow 0^+} e^{x \ln(t) \ln(t)} = 0$ par croissances comparées. Donc la fonction f se prolonge encore en 0 par 1.

Ainsi, la fonction F est définie sur \mathbb{R} .

5.2. Soit $x < y$ deux réels. D'après les questions de cours, pour tout $t \in]0, 1[$, $t^x > t^y$, donc $t^x < t^y$. En intégrant, on obtient $F(x) \leq F(y)$, donc F est croissante sur \mathbb{R} .

5.3. On remarque que $F(0) = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}$. Comme F est croissante sur \mathbb{R} , pour tout $x \geq 0$, $F(x) \geq F(0) = \frac{1}{2}$.

5.4. Pour tout $t \in]0, 1]$, la fonction $x \mapsto t^x$ est continue sur \mathbb{R} . De plus, pour tout $t \in]0, 1]$ et tout $x \in \mathbb{R}$, $t^x \leq 1$ qui est intégrable sur $[0, 1]$. D'après le théorème de continuité sous l'intégrale, la fonction F est continue sur \mathbb{R} .

5.5. Pour tout $t \in]0, 1]$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} t^x = 0$, la fonction $t \mapsto 0$ est continue sur $]0, 1]$ et la domination de la question précédente s'applique encore. D'après le théorème de convergence dominée, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \int_0^1 0 dt = 0$. De même, comme pour tout $t \in]0, 1]$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} t^x = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$.

5.6. A faire ! Dresser alors avec soin le tableau de variations de F et donner une allure générale de sa courbe représentative dans un repère orthonormal. On admettra que $F'(0) = \frac{1}{4}$ et on tracera la tangente au point d'abscisse $x = 0$.

6. Soit x un réel strictement positif.

Pour tout entier naturel n , on note g_n la fonction définie sur $]0, 1]$ par $g_n(t) = \frac{t^{nx} \ln^n(t)}{n!}$.

6.1. Soit $t \in]0, 1]$. La série $\sum_{n \geq 0} g_n(t)$ est une série exponentielle qui converge vers $e^{t^x \ln(t)} = t^{t^x}$. Donc la série de fonctions $\sum_{n \in \mathbb{N}} g_n$ converge simplement sur $]0, 1]$ vers la fonction $t \mapsto t^{t^x}$.

6.2. Soit $n \in \mathbb{N}$. On peut faire des intégrations par parties successives, ou bien on effectue le changement de variable C^1 bijectif $u = -\ln(t)$, de sorte que $\int_0^1 |g_n(t)| dt = \frac{1}{n!} \int_{+\infty}^0 e^{-nux} |(-u)^n| e^{-u} du = \frac{1}{n!} \int_0^{+\infty} e^{-u(nx+1)} u^n du$, puis le changement $v = u(nx+1)$, pour obtenir $\int_0^1 |g_n(t)| dt = \frac{1}{n!} \int_0^{+\infty} e^{-v} \frac{v^n}{(nx+1)^n} dv$. Cette dernière intégrale étant convergente, celle d'origine l'était aussi et de plus, $\int_0^1 |g_n(t)| dt = \frac{1}{n!} \frac{\Gamma(n+1)}{(nx+1)^{n+1}} = \frac{1}{(nx+1)^{n+1}}$.

6.3. La série $\sum_{n \in \mathbb{N}} g_n$ converge simplement vers $t \mapsto t^{t^x}$ qui est continue sur $]0, 1]$. De plus, la série

$\sum_{n \geq 0} \int_0^1 |g_n(t)| dt = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(nx+1)^{n+1}}$ converge car c'est une série à termes positifs de terme général $\frac{1}{(nx+1)^{n+1}} = o(1/n^2)$.

On peut donc intervertir la somme et l'intégrale :

$$F(x) = \int_0^1 t^x dt = \int_0^1 \sum_{n=0}^{+\infty} g_n(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 |g_n(t)| dt.$$

Or, pour tout $t \in]0, 1]$, $|g_n(t)| = (-1)^n g_n(t)$ car $\ln(t) < 0$.

Ainsi, finalement : $F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(nx+1)^{n+1}}$.

EXERCICE 3

On note E l'espace vectoriel des fonctions à valeurs réelles continues sur \mathbb{R}_+ .

Pour tout élément f de E et tout $x \in \mathbb{R}_+$ on pose $F(x) = \int_0^x f(u) du$.

- F est la primitive qui s'annule en 0 de la fonction f continue sur \mathbb{R}_+ . Le théorème fondamental de l'analyse permet d'affirmer que la fonction F est de classe C^1 sur $[0, +\infty[$.

Ainsi, pour tout x réel positif, on a : $F'(x) = f(x)$.

Soit $\Psi : f \in E \mapsto \Psi(f)$ définie par : $\forall x \in \mathbb{R}_+, \Psi(f)(x) = \int_0^1 f(xt) dt$.

- Soit $x > 0$.

Le changement de variable affine $u = xt$ permet d'écrire que : $\Psi(f)(x) = \frac{F(x)}{x}$.

- D'après la question de cours 1. la fonction $\Psi(f)$ est continue sur \mathbb{R}_+^* .

Étude en 0 : on a, pour tout $x > 0$, $\Psi(f)(x) = \frac{F(x) - F(0)}{x - 0}$ et donc, $\lim_{x \rightarrow 0} \Psi(f)(x) = F'(0) = f(0)$.

On en déduit que $\Psi(f)$ est continue sur \mathbb{R}_+ avec $\Psi(f)(0) = f(0)$.

- La linéarité de l'intégration donne celle de Ψ .

De plus, d'après la question précédente, pour toute f de E , on a $\Psi(f) \in E$, ce qui achève de prouver que Ψ est un endomorphisme de E .

- Surjectivité de Ψ**

Soit $h : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto h(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{pour } x > 0 \\ 0 & \text{pour } x = 0 \end{cases}$

- Par opérations élémentaires, la fonction h est continue sur \mathbb{R}_+^* .

Étude en 0 : On a, pour tout $x > 0$, $|h(x)| \leq |x|$, ce qui prouve que $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 0 = h(0)$.

Il en résulte que la fonction h est continue sur \mathbb{R}_+ .

- Soit $x > 0$. Étudions la dérivabilité de la fonction h en 0.

On a : $\Delta(x) = \frac{h(x) - h(0)}{x - 0} = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

On considère alors la suite u définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{1}{n\pi + \pi/2}$.

Alors, pour tout entier naturel n , $\Delta(u_n) = (-1)^n$, ce qui prouve que $\Delta(x)$ n'admet pas de limite lorsque x tend vers 0.

Il en résulte que h n'est pas dérivable en 0 et donc, ne peut être de classe C^1 sur \mathbb{R}_+ .

5.3. Soit $g \in \text{Im}(\Psi)$: il existe donc $f \in E$ telle que $g = \Psi(f)$.

Alors, pour tout $x > 0$, $xg(x) = F(x)$ et $0 \times g(0) = 0 = F(0)$.

On en déduit que la fonction $x \mapsto xg(x)$ coïncide avec la fonction $x \mapsto F(x)$ sur \mathbb{R}_+ .

Conclusion : la fonction $x \mapsto xg(x)$ est de classe C^1 sur \mathbb{R}_+ .

5.4. En utilisant la question précédente regardons si la fonction $\theta : x \mapsto xh(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ est de classe C^1 sur \mathbb{R}_+ :

- Facilement, puisque pour tout $x > 0$, on a : $|\theta(x)| \leq x^2$, la fonction θ est de classe C^0 sur \mathbb{R}_+ avec $\theta(0) = 0$.

- Pour $x > 0$, $\frac{\theta(x) - \theta(0)}{x - 0} = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0 : la fonction θ est dérivable sur \mathbb{R}_+ et $\theta'(0) = 0$.

- Pour tout $x > 0$, $\theta'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ qui n'admet pas de limite en 0 puisque la fonction $x \mapsto \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ n'en possède pas (On procède comme à la question **5.2**)

Il en résulte que la fonction θ n'est pas de classe C^1 sur \mathbb{R}_+ , ce qui prouve d'après la question précédente que $h \notin \text{Im}(\Psi)$.

5.5. On déduit de l'étude précédente que Ψ n'est pas surjective.

6. Soit $f \in E$ telle que $\Psi(f) = 0$ (fonction nulle)

Ainsi, pour tout $x > 0$, $\frac{F(x)}{x} = 0$, soit $\forall x > 0, F(x) = 0$.

Comme F est continue sur \mathbb{R}_+ , on en déduit que F est nulle sur \mathbb{R}_+ et par dérivation que f est aussi nulle sur \mathbb{R}_+ .

Conclusion : Ψ est injective.

7. Recherche des éléments propres de Ψ

7.1. Comme Ψ est injective, 0 n'est pas valeur propre de Ψ .

Soit $\mu \in \mathbb{R}$. On considère l'équation différentielle (L) sur \mathbb{R}_+^* :

$$y' + \frac{\mu}{x}y = 0$$

7.2. Les solutions de (L) sur \mathbb{R}_+^* sont les fonctions $x \mapsto \frac{C}{x^\mu}$ où $C \in \mathbb{R}$ et $\mu \in \mathbb{R}$.

7.3. Pour qu'une solution de (L) soit prolongeable par continuité sur \mathbb{R}_+ il faut qu'elle possède une limite finie en 0.

- Si $\mu \leq 0$, la fonction $x \mapsto \frac{C}{x^\mu}$ possède une limite finie en 0.

- Si $\mu > 0$, la fonction $x \mapsto \frac{C}{x^\mu}$ n'est prolongeable par continuité en 0 que si, et seulement si, $C = 0$ et c'est donc la fonction nulle.

Conclusion : Les solutions de (L) prolongeable par continuité en 0 sont les fonctions $x \mapsto \frac{C}{x^\mu}$, avec $\mu \leq 0$ et $C \in \mathbb{R}$.

7.4. Soit λ une valeur propre de Ψ et f une fonction non nulle du sous-espace propre associé $E_\lambda(\Psi)$.

Ainsi, pour tout $x > 0$, $\frac{F(x)}{x} = \lambda f(x) = \lambda F'(x)$.

Ainsi, F est solution de l'équation (L) dans le cas où $\mu = -\frac{1}{\lambda}$.

Mais comme F est continue sur \mathbb{R}_+ , il faut récupérer les solutions de (L) prolongeables par continuité sur \mathbb{R}_+ , ce qui donne : $\lambda > 0$ et $\forall x \in \mathbb{R}_+$, $F(x) = C x^{1/\lambda}$ puis $f(x) = x^{\frac{1}{\lambda}-1}$.

Mais il faut aussi que f soit continue sur \mathbb{R}_+ et donc $\frac{1}{\lambda} - 1 \geq 0$ ce qui donne finalement $\lambda \in]0, 1]$

Ainsi, le spectre de Ψ est inclus dans $]0, 1]$ et facilement, $E_\lambda(\Psi) \subset \text{Vect}(x \mapsto x^{\frac{1}{\lambda}-1})$.

Réciproquement, soit $\lambda \in]0, 1]$ et $f_\lambda : x \mapsto x^{1/\lambda-1}$.

On a : $\Psi(f_\lambda) = \int_0^1 (xt)^{\frac{1}{\lambda}-1} dt = x^{\frac{1}{\lambda}-1} [\lambda t^{\frac{1}{\lambda}}]_0^1 = \lambda f_\lambda(x)$.

Finalement, on a donc démontré que le spectre de Ψ est $]0, 1]$ et que pour chaque valeur propre $\lambda > 0$, le sous-espace propre associé est : $E_\lambda(\Psi) = \text{Vect}(x \mapsto x^{\frac{1}{\lambda}-1})$.

8. Soit $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$. Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose :

$$f_i : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto f_i(x) = x^i \text{ et } g_i : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto g_i(x) = \begin{cases} x^i \ln(x) & \text{pour } x > 0 \\ 0 & \text{pour } x = 0 \end{cases}$$

On note $\mathcal{B} = (f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_n)$ et F_n le sous-espace vectoriel de E engendré par \mathcal{B} .

8.1. On veut montrer que la famille $\mathcal{B} = (f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_n)$ est une base de F_n

Soient $(\alpha_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ et $(\beta_j)_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ des scalaires tels que $\sum_{i=1}^n \alpha_i f_i + \sum_{j=1}^n \beta_j g_j = 0$ (*).

8.1.1. Soit $x > 0$.

En simplifiant par x non nul, on a : $\sum_{i=1}^n \alpha_i x^{i-1} + \sum_{j=1}^n \beta_j x^{j-1} \ln(x) = g(x) = 0$.

- Si $\beta_1 \neq 0$, alors $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) \neq 0$ et donc $\beta_1 = 0$.
- On en déduit que $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \alpha_1$ et donc que $\alpha_1 = 0$.

8.1.2. Soit $p \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. On suppose que $\alpha_1 = \dots = \alpha_p = \beta_1 = \dots = \beta_p = 0$.

On a toujours $x > 0$ et on simplifie (*) par x^{p-1} cette fois, ce qui donne :

$$\sum_{i=p+1}^n \alpha_i f_{i-p+1} + \sum_{j=p+1}^n \beta_j g_{j-p+1} = 0$$

Par le même raisonnement qu'au-dessus, on obtient alors $\alpha_{p+1} = \beta_{p+1} = 0$.

8.1.3. Par récurrence forte, on a donc montré que $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = \beta_1 = \dots = \beta_n = 0$, ce qui prouve la liberté de la famille \mathcal{B} et que $\dim(F_n) = 2n$.

8.2. Où l'on démontre que Ψ induit un endomorphisme sur F_n

8.2.1. Soient $x > 0$ et $p \in \mathbb{N}^*$.

La fonction $t \mapsto t^p \ln(t)$ est continue sur l'intervalle $]0, x]$.

Par croissances comparées, $\lim_{t \rightarrow 0} t^p \ln(t) = 0$ et donc, on peut prolonger par continuité la fonction $t \mapsto t^p \ln(t)$ sur l'intervalle $[0, x]$.

Conclusion : l'intégrale $\int_0^x t^p \ln(t) dt$ converge.

Comme les fonctions $t \mapsto t^{p+1}$ et $t \mapsto \ln(t)$ sont de classe C^1 sur \mathbb{R}_+^* , on peut effectuer une intégration par parties :

$$\int_0^x t^p \ln(t) dt = \left[\frac{t^{p+1}}{p+1} \ln(t) \right]_0^x - \int_0^x \frac{t^{p+1}}{p+1} \frac{1}{t} dt = \frac{x^{p+1}}{p+1} \ln(x) - \frac{x^{p+1}}{(p+1)^2}.$$

8.2.2. Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Alors, pour tout $x \geq 0$, on a :

$$\Psi(f_i)(x) = \int_0^1 (xt)^i dt = x^i \left[\frac{t^{i+1}}{i+1} \right]_0^1 = \frac{1}{i+1} x^i, \text{ soit } \Psi(f_i) = \frac{1}{i+1} f_i \in F_n$$

$$\text{et } \Psi(g_i) = \int_0^1 (xt)^i \ln(xt) dt = \int_0^1 (xt)^i (\ln(x) + \ln(t)) dt = \frac{1}{i+1} x^i \ln(x) - \frac{1}{(i+1)^2} x^i, \text{ soit}$$

$$\Psi(g_i) = \frac{1}{i+1} g_i - \frac{1}{(i+1)^2} f_i \in F_n.$$

On en déduit que Ψ induit un endomorphisme Ψ_n sur F_n .

8.3. On en déduit la matrice de l'application Ψ_n dans la base \mathcal{B} :

$$M_{\mathcal{B}}(\Psi) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \dots & 0 & -\frac{1}{2^2} & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \dots & \dots & & \dots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \dots & & \dots & 0 \\ \vdots & & & \frac{1}{n+1} & \dots & \dots & -\frac{1}{(n+1)^2} \\ \vdots & & & \ddots & \frac{1}{2} & & 0 \\ \vdots & & & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & & \frac{1}{n+1} \end{pmatrix}$$

8.4. $M_{\mathcal{B}}(\Psi)$ est une matrice triangulaire dont aucun des termes diagonaux est nuls : c'est une matrice inversible et donc, Ψ_n est un automorphisme de F_n .

On aurait aussi pu dire que l'injectivité de Ψ entraîne celle de Ψ_n et en tant qu'endomorphisme injectif de F_n qui est de dimension finie, c'est un automorphisme de F_n .

8.5. Soit $z : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto z(x) = \begin{cases} (x + x^2) \ln(x) & \text{pour } x > 0 \\ 0 & \text{pour } x = 0 \end{cases}$.

On a : $z = g_1 + g_2 \in F_n$.

Puis, on prend $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i + \sum_{j=1}^n \beta_j g_j \in F_n$ et on écrit que $\Psi_n(f) = z$, ce qui donne le système :

$$\begin{cases} \frac{\alpha_1}{2} - \frac{\beta_1}{4} = 0 \\ \frac{\alpha_2}{3} - \frac{\beta_2}{9} = 0 \\ \frac{\beta_1}{2} = 1 \\ \frac{\beta_2}{3} = 1 \end{cases}$$

soit finalement, $\Psi^{-1}(z) = f_1 + f_2 + 2g_1 + 3g_2$

EXERCICE 4

Soit n un entier naturel non nul.

Questions de cours

1. Soit p une projection vectorielle de rang $r \in \mathbb{N}$.

1.1. Lorsque $r = 0$, W est la matrice nulle. Lorsque $r = n$, $W = I_n$. Dans les autres cas, on écrit la matrice par blocs : $W = \begin{pmatrix} I_r & 0_{r,n-r} \\ 0_{n-r,r} & 0_{n-r} \end{pmatrix}$.

1.2. Lorsque $r = 0$, $\mathbf{Sp}(W) = \{0\}$. Lorsque $r = n$, $\mathbf{Sp}(W) = \{1\}$. Dans les autres cas, $\mathbf{Sp}(W) = \{0, 1\}$

1.3. On a $\mathbf{rg}(W) = \mathbf{tr}(W)$.

1.4. Si $r = n$, $\mathbf{det}(W) = 1$. Sinon, $\mathbf{det}(W) = 0$.

On considère la famille X_1, \dots, X_n de variables aléatoires indépendantes définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ toutes suivant la loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$.

Soit M une variable aléatoire discrète de Ω dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que pour tout ω dans Ω , $M(\omega)$ est diagonalisable et semblable à $\Delta(\omega) = \text{diag}(X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$.

2. On note T la variable aléatoire $\mathbf{tr}(M)$.

2.1. Comme la trace est invariante par similitude, $T = \mathbf{tr}(\Delta) = \sum_{k=1}^n X_k$. Comme X_1, \dots, X_n sont à valeurs dans $\{0, 1\}$, T est donc à valeurs dans $[[0, n]]$.

2.2. T est la somme de n variables aléatoires indépendantes suivant toutes la même loi de Bernoulli de paramètre p . T suit donc une loi binomiale de paramètres n et p .

D'après le cours, $\mathbb{E}(T) = np$.

3. Comme le rang est invariant par similitude, $R = \text{rg}(\Delta) = \sum_{k=1}^n X_k$ car Δ est une matrice de projection.
Donc $R = T$ et suit donc aussi une loi binomiale de paramètres n et p .

4. On note D la variable aléatoire $\det(M)$.

4.1. Comme le déterminant est invariant par similitude, $D = \det(\Delta) = \prod_{k=1}^n X_k$. Donc $D(\Omega) = \{0, 1\}$.

4.2. D suit donc une loi de Bernoulli de paramètre $\mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 1, \dots, X_n = 1) = p^n$ car les variables sont indépendantes. Donc $\mathbb{E}(D) = p^n$.

5. On se propose de déterminer la probabilité de l'évènement Z :

« les sous-espaces propres de la matrice M ont tous la même dimension ».

5.1. Comme le spectre est invariant par similitude, $V = \bigcap_{k=1}^n (X_k = 1) \cup \bigcap_{k=1}^n (X_k = 0)$ et les deux évènements sont incompatibles. Donc $\mathbb{P}(V) = p^n + (1-p)^n$ par indépendance.

5.2. Rappelons que M a soit une valeur propre, soit deux valeurs propres distinctes. Comme n est impair, si M a deux valeurs propres distinctes, les deux sous-espaces propres ne peuvent pas être de la même dimension. Donc $Z = V$, et $\mathbb{P}(Z) = p^n + (1-p)^n$.

5.3. Comme T suit la loi binomiale de paramètres n et p , $\mathbb{P}(T = r) = \binom{2r}{r} p^r (1-p)^r$.
L'évènement $(T = r)$ correspond à : $\dim(E_1(M)) = r$. Comme $n = 2r$, on a donc aussi $\dim(E_0(M)) = r$. On obtient ainsi : $Z = V \cup (T = r)$, donc $\mathbb{P}(Z) = p^{2r} + (1-p)^{2r} + \binom{2r}{r} p^r (1-p)^r$.

6. Pour tout $\omega \in \Omega$, on note $U(\omega) = \begin{pmatrix} X_1(\omega) \\ \vdots \\ X_n(\omega) \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et $A(\omega) = U(\omega) \times (U(\omega))^T = (a_{ij}(\omega))_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2}$.

6.1. Soit $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $a_{ij}(\omega) = X_i(\omega)X_j(\omega)$.

6.2. Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. La variable a_{ii} suit une loi de Bernoulli de paramètre $\mathbb{P}(X_i^2 = 1) = p$.
Si $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ avec $i \neq j$, la variable a_{ij} suit une loi de Bernoulli de paramètre

$$\mathbb{P}(X_i = 1, X_j = 1) = p^2$$

par indépendance.

6.3. $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \sum_{i=1}^n X_i^2$. Or, $X_i^2 = X_i$ car X_i ne prend que les valeurs 0 et 1.

On en déduit donc que : $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n X_i$.

6.4. On remarque que toutes les colonnes de A sont liées (elles sont toutes multiples de U). Donc le rang de A vaut 0 si U est nulle et 1 sinon : $\text{rg}(A)(\Omega) = \{0, 1\}$.

6.5. Soit ω dans Ω . Trois cas se présentent :

- soit $A(\omega)$ est la matrice nulle et sa seule valeur propre est 0 ;

- soit $A(\omega)$ est non nulle et $n = 1$ et sa seule valeur propre est 1 ;
- soit $A(\omega)$ est non nulle et $n > 1$ et elle a deux valeurs propres 0 et $\sum_{i=1}^n X_i(\omega)^2 = T(\omega)$.

6.6. Comme $\mathbb{P}(U = 0) = \mathbb{P}(X_1 = 0, \dots, X_n = 0) = (1 - p)^n$ par indépendance, $\mathbf{rg}(A)$ suit la loi de Bernoulli de paramètre $1 - (1 - p)^n$.

COMMENTAIRES

• Commentaires généraux

Malheureusement, il me faut reprendre presque intégralement les remarques générales faites l'an dernier sur les copies :

- Les correcteurs ont signalé à plusieurs reprises un nombre important de copies mal ordonnées, mal présentées, raturées (la rédaction de la copie ne doit pas occasionner un jeu de piste pour l'examineur) : **les étudiants doivent s'appliquer à présenter une copie claire et propre.**

Il est rappelé que les copies doivent être correctement numérotées, dans un ordre cohérent.

Notons que nous avons rencontré cette année des copies quasiment illisibles et donc lourdement pénalisées.

Rappelons aussi que l'orthographe fantaisiste donne une très mauvaise impression à la lecture de la copie.

- Il semble judicieux d'éviter d'utiliser des expressions telles que « il est trivial que », « par une récurrence immédiate », « il est clair que » etc... : rappelons que toute proposition énoncée dans une copie se doit d'être démontrée.

- Il ne suffit pas d'écrire « je peux utiliser le théorème car ses hypothèses sont vérifiées »... , il faut les vérifier !

- Enfin, un exemple ne permet pas de démontrer un résultat général.

Les quatre exercices constituant le sujet permettaient de parcourir les parties les plus classiques du programme de deuxième année de classe préparatoire MP.

- Signalons qu'une lecture attentive de la totalité du sujet permet souvent de comprendre l'architecture et la démarche proposée dans chaque exercice.

Il nous a semblé en effet que beaucoup de candidats lisent de plus en plus approximativement l'énoncé, ce qui induit nombre d'erreurs facilement évitables : « donner sans démonstration » donne lieu à une démonstration, « démontrer par récurrence » ne donne pas lieu à une récurrence, la donnée $F'(0) = \frac{1}{4}$ se

transforme en $F(0) = \frac{1}{4}$ etc...

- Un grand nombre d'étudiants ne maîtrise pas les notions de base d'algèbre linéaire, même de première année, ainsi que les théorèmes principaux d'analyse du programme de deuxième année de MP et espèrent cependant venir à bout des questions posées en utilisant des recettes toutes faites bien souvent mal comprises.

- Nous constatons de nouveau une très grande maladresse dans les calculs (parfois très simples) qui sont trop rapidement abandonnés.

De plus, beaucoup de candidats ne manipulent pas correctement les quantificateurs, ce qui entraîne de grosses difficultés dans les démonstrations, voire des contradictions.

- Dans le même type d'erreurs, on constate une grande confusion dans beaucoup de copies entre variable et paramètre : cela occasionne de grosses erreurs en particulier dans les intégrales à paramètre. Il est par

ailleurs curieux de voir des candidats chercher un équivalent de la fonction à intégrer au voisinage de $+\infty$ alors que l'on intègre entre 0 et 1 !

- Enfin, notons une nouvelle fois que les examinateurs ne goûtent guère des arguments inventés ou fallacieux pour arriver à toute force au résultat annoncé dans l'énoncé.

- Reste à signaler que les probabilités génèrent un refus de beaucoup de candidats : près de 30% des candidats n'aborderont pas cet exercice : rappelons que nous posons systématiquement un exercice de probabilité.

Conclusion : Nous souhaitons obtenir dans la résolution des exercices proposés de la rigueur, une rédaction claire et lisible et une justification des résultats en utilisant à bon escient le cours : ainsi, nous encourageons les candidats à rédiger le plus proprement, correctement et rigoureusement possible leurs copies, en détaillant clairement les calculs effectués et les théorèmes utilisés à chaque étape de la résolution, sans forcément chercher à tout traiter de façon superficielle.

Nous rappelons enfin qu'il vaut mieux admettre clairement le résultat d'une question et avancer dans la résolution du reste de l'exercice plutôt que de donner des arguments faux qui indisposent nécessairement le correcteur.

Nous proposons chaque année dans ce rapport une correction détaillée du sujet et invitons vivement les candidats à l'étudier attentivement.

• Commentaires par exercices

• Exercice 1.

Beaucoup de candidats ont du mal pour compter de 0 à n mais comme ils ne connaissent pas la dimension de $\mathbb{R}_n[X]$, les erreurs se compensent... Apparaît souvent la dimension d'une famille de vecteurs ! (confusion entre dimension et cardinal).

La formule de Taylor pour les polynômes est ignorée par plus d'un candidat sur deux.

Dans la question 3. il est loin d'être évident pour nombre de candidats que $R = 0$.

Curieusement, la question 4. a posé problème : des termes disparaissent lors du développement des parenthèses. Le cas $k = 0$ est trop souvent oublié.

Trop de candidats oublient de considérer la loi externe pour montrer qu'une application est linéaire. Certains tentent d'utiliser le calcul de $T(P_k)$ pour démontrer que $T(E_n) \subset E_n$ en oubliant de préciser que la famille des P_k est une base de E_n .

La matrice demandée à la question 6. est souvent fautive après de nombreux essais raturés : rappelons que la copie rendue n'est pas un brouillon !

Les questions 7. et 8. sont rarement abordées.

• Exercice 2.

Globalement, des négligences dans les écritures rendent les affirmations insensées. Citons par exemple : « t^{t^x} est continue » ; « t^{t^x} est croissante »

1. Question traitée par tous les candidats.
2. Question résolue souvent sans explication.

3. Il est désolant de constater que cette question est souvent fautive en ce qui concerne le domaine de validité.

4. Il est surprenant d'obtenir fréquemment $\Gamma(1) = -1$ ou $\Gamma(1) = 0$...

On lit trop souvent « par une récurrence immédiate » ...

Certains candidats ne lisent pas correctement l'énoncé et redémontrent que la fonction Γ est définie sur \mathbb{R}_+^* et que $\forall x > 0, \Gamma(x+1) = \Gamma(x)$, ce qui n'était pas demandé, sans traiter la fin de la question...

5.

5.1. Question très souvent mal traitée (plus d'un candidat sur deux) : on lit que la définition de F découle de la continuité de t^x sur le segment $[0, 1]$.

Pour certains candidats, l'intégrale est définie si, et seulement si, l'intégrande est défini...

Avant d'étudier l'intégrabilité d'une fonction, il serait judicieux de s'interroger d'abord sur quel ensemble elle est continue (ou continue par morceaux) : cela peut éviter des études inutiles.

5.2. Question souvent bien traitée : certains cependant tentent de démontrer que F est C^1 sur son ensemble de définition : une lecture attentive de l'énoncé aurait permis d'éviter cette piste.

Ne pas oublier que le signe de $F(x+1) - F(x)$ ne permet pas de conclure quand au sens de variation de F .

5.3. Correctement traitée en général.

5.4. Correctement traitée en général.

5.5. Noter que la domination sur un segment ne fonctionne pas dans cette question.

5.6. Trop peu de candidats se risquent à donner une allure de la courbe représentative de F : c'est dommage.

6. Questions très rarement abordées.

Rappelons que la dérivée de $|g_n|$ n'est pas $|g'_n|$!

• Exercice 3.

1. Réponses catastrophiques à cette question que l'on pose à peu près tous les ans...

On cite le Théorème fondamental de l'analyse sans plus de précision et le calcul de $F'(x)$ reste loufoque...

2. Nombreux sont les candidats qui n'arrivent pas à mettre en oeuvre correctement le changement de variable $u = xt$ et obtiennent des résultats faux : $\Psi(f)(x) = x F(x)$ voire $\Psi(f)(x) = F(x)$!

3. Très rarement traitée : beaucoup de candidats n'ont pas vu l'intérêt de la question 2.

4. Pas de problème.

5.

5.1. Nombre de candidats « prolongent » la fonction h par continuité en 0, alors que la fonction est définie en 0 !

Encore une fois, une lecture attentive de l'énoncé évite une telle erreur.

5.2. Il est surprenant de constater que pour beaucoup d'étudiants, h de classe C^1 en 0 signifie que h' tend vers 0 (!), sans s'assurer que $h'(0)$ existe et vaut 0...

5.3. Les questions **5.2** à **5.5** sont rarement abordées et $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ donne lieu à des résultats surprenants.

6. Les erreurs les plus courantes :

- $\int_0^1 f(xt) dt = 0 \implies f = 0$ car $f \geq 0$
- f est continue d'intégrale nulle, donc f est nulle.
- Puisque Ψ n'est pas surjective elle ne peut être injective.

7.

7.1. Pas de problème.

7.2. Question souvent mal traitée : des candidats ne mentionnent que la fonction $x \mapsto \frac{1}{x^\mu}$ et d'autres semblent perturbés par les variables et donnent comme solutions les $y : t \mapsto \exp\left(-\frac{\mu t}{x}\right)$.

7.3. et **7.4.** peu abordées et sans beaucoup de succès.

8. Question incomprise par 99% des candidats pour qui **8.1.1.** est le cas $n = 1$. Ainsi, en **8.1.2.**, ils disent : « de même qu'en **8.1.1.** » ...

Le reste des sous-questions est très rarement abordé.

• Exercice 4.

Exercice assez bien traité pour ceux qui l'ont abordé.

Quelques remarques :

- Les résultats sont souvent donnés sans une phrase, sans une explication (incompatibilité, indépendance).
- Des étudiants n'hésitent pas à affirmer que le spectre d'une matrice diagonale constituée de 0 et de 1 est égal à $\{-1, 1\}$!
- Régulièrement, les résultats donnés pour $T(\Omega)$, $R(\Omega)$ ou $D(\Omega)$ ne sont pas des ensembles. Par exemple,

$$T(\Omega) = \sum_{i=1}^n X_i(\omega).$$

FIN

Luc VALETTE